

#### 3. 토마토반점위조바이러스, 고추, 2005, 충남 당진1

2005년 안양 관양동에서 토마토반점위조바이러스의 대발생 민원이 발생하였는데, 같은 해인 2005년 8월에 충남당진에서 고추에 감염된 바이러스 민원이 발생하여 출장 조사하였다.

우리나라에서 2004년 처음으로 충남 예산에서 파프리카 바이러스 감염주가 민원으로 송부되어 토마토반점위조바이러스로 처음으로 진단되었는데, 예산의 동일 농가에서 이 바이러스의 발생이 확인되지 않았으나, 이웃 지역인 당진에서 바이러스가 발생 하였다. 당진의 처음 발생 농가는 감자를 재배한 후 발생하였다고 하여서 공급된 감자를 진단하였으나 바이러스 감염은 확인되지 않았다.


토마토반점위조바이러스가 고추 식물체에서 발현하는 다중 원형반점 증상은 매우 전형적인 증상이며 이와 함께 다양한 특별한 증상들이 나타나므로 증상을 보면서 바이러스를 이해하기 바란다.

2005년 8월 3일 촬영











▼ 당진의 다른 농가의 비닐 하우스에서 공동 연구 책임자인 김진영박사님이 조사하고 있다.













## 4. 토마토반점위조바이러스, 고추, 2005, 충남 당진2

2005년 8월3일에 조사한 고추 하우스와 주변의 노지 포장을 8월 31일과 9월 22일 생육 후기에 조사하여 병증 진전 상황을 보았다. 2005년 8월 31일 촬영




























## 5. 토마토반점위조바이러스, 고추, 2005, 경기 안양

안양 관양동 비닐하우스 재배지역은 토마토 등 과채류와 엽채류 등의 도시근교 농업 지역인데 2005년 토마토반점위조바이러스가 대 발생 하였으며, 고추의 증상을 소개한다.



◆ 2005년 6월 14일, 안양 관양동 비닐하우스 채소 재배지역의 인근 노지에 재배한 고추의 토마토반점위조바이러스 발생 포장이다. 정식 초기이며 중간에 많이 결주된 것이 보이며 이곳은 바이러스 감염으로 고사하였으며, 생육이 저조한 고추도 모두 바이러스에 감염되었다.





▲ 고추 잎 괴저반점과 순의 괴저 증상으로 고사한다.



▲ 고추 순의 줄기가 아래로 괴저 증상으로 고사한다.



▲ 고추 잎에서 여러 겹의 다중 퇴록, 괴저 원형반점은 토마토반점위조바이러스의 전형적인 증상이다



▲ 괴저반점과 황화 증상도 주요 증상의 하나이며, 식물체 고사로 진전된다.



▲ 심한 모자이크와 기형 증상도 대표 증상이며, 황화 괴저 증상도 나타난다.



▲ 심한 모자이크와 기형이다. 고추에서는 오이모자이크바이러스(CMV)의 대표 증상이나 CMV 등 다른 바이러스의 감염은 없었기 때문에 이 증상도 토마토 반점위조바이러스의 대표 증상이다.



▲ 정상적으로 생육하는 고추로 보이지만(좌), 잎에 원형반점(중), 괴저 다중 원형반점(우)이 나타났다.



◀ 바이러스 감염으로 순이 고사하였고, 이 후 새로운 순이 발육하여 정 상적으로 생육하는 것으로 보인다.

그러나 새순은 심한 모자이크, 기형으로 정상적인 생육을 할 수 없다.

## 6. 토마토반점위조바이러스, 고추, 2006, 전남 순천

종자회사를 통하여 민원이 접수되어 순천지역을 방문하였다. 이 농가는 광주지역의 육묘장에서 묘를 구입하여 재배하였으며, 육묘장과 농업인 간에 손해배상에 관한 논의가 있었지만 현실적으로 보상은 되지 않았다.





▲ 토마토반점위조바이러스 발생 포장이다.



▲ 전형적인 황화, 괴저, 심한 모자이크의 바이러스 감염 증상인데, 농약을 많이 살포한 흔적이 보인다.



▲ 고추 과실과 잎의 괴저 원형반점 증상이다. 농업인은 바이러스 감염을 알았으면 농약 살포를 하지 않았을 텐데 하면서 농약 비용만 들었다고 하였다



▲ 황화, 심함 위축 증상



▲ 순(bud) 괴저증상이며 생육이 정지하고 결국 고사한다.



▲ 고추 과실에 전형적인 퇴록과 괴저 원형반점이 나타나 토마토반점위조바이러스 감염을 바로 알 수 있다.



▲ 전형적인 다중 원형반점을 볼 수 있으며, 3개가 모여서 하나의 큰 원형반점을 만드는 특이한 증상이다. 위에 보이는 원형반점은 가운데는 동그랗지만 가장자리는 각이 있어 매우 특이한 증상이다.



▲ 육묘 트레이의 감염묘로 황화, 고사 증상이 심하다. 육묘장을 운영하는 농업인은 증상이 나타난 위 부분을 자르고 새순을 받으면 증상이 나타나지 않는다고 하였지만, 바이러스는 전신감염되어 새순을 받아도 또 다시 증상이 나타나 공연한 수고를 하였다.



▲ 고추 유묘의 잎을 근접 촬영하여 보면 토마토반점위조바이러스의 전형적인 원형반점 증상을 볼 수 있다.



▲ 주변의 다른 육묘장도 감염되어 있었다



▲ 또 다른 육묘장의 경우에도 감염되어 있었다.

#### 16. 토마토반점위조바이러스, 국화, 2006, 충남 태안

토마토반점위조바이러스(TSWV)는 고추, 토마토 등 가지과 식물에 병원성이 매우 강하며, 아울러 화훼류에도 피해가 심한데 특히 국화는 절화를 생산하는데 있어서 생육 초기에 감염되었어도 꽃 봉오리가 생기는 생육 후기에 증상이 잘 발현되는 특성이 있어 증상을 보고서 신속히 대처하기가 어렵다. 2006년 4월 27일 촬영.



## 토마토덤불위축바이러스



◀ 전형적인 감염 방울토마토의 바이러스 증상인 약간 움푹 들어가고 괴저 증상도 간혹 발현된다. 대부분은 기형이다.

4장

# 토마토반점위조바이러스 TSWV

## 1. 토마토반점위조바이러스 감자, 2005, 경기 안양

안양 관양동 비닐하우스 채소 재배단지 옆의 노지에 심겨진 감자에서 토마토반점위조바이러스(*Tomato spotted wilt virus*, TSWV)가 발생하였다. 2005년 6월 14일 촬영하였다. 감자는 우리나라 주요 식량작물의 하나이므로 TSWV의 전국적 확산이 우려되었다.




▲ 감자 포장을 멀리서 보면 바이러스 감염을 잘 볼 수 없지만 가까이 보면 횟화괴저 증상이 보인디



▲ 감자잎말림바이러스(PLRV)의 증상(좌)도 나타나며, 잎에 괴저 원형반점 증상(우)도 관찰된다.



▲ 괴저 원형반점(좌)과 황화증상과 함께 괴저 원형반점(우)이 나타난다.



▲ 다양한 증상이며, 건전하게 보이지만 잎에 전형적인 원형반점 증상이 나타난다.



▲ 투마투반점위주바이러스의 저형점이 괴저 다준 워형반점이다. 2~6경의 다준 워형반점을 볼 수 있다.



▲ 다중 원형반점이 나타난 부위는 괴저로 진행되어 여러 개가 합쳐져서 잎 괴저로 된다.



▲ 다중 원형반점으로 잎은 괴저, 기형이 되며(좌), 식물체는 위축된다(우).



▲ 워혓바적 괴저바적과 함께 일맥 괴저도 나타나는데 특이한 증상이다

▲ 잎에 괴저반점이 심하게 나타나지 않으나. 심하게 식물체 노화가 나타난다

## 2. 토마토반점위조바이러스, 감자, 2007, 충남 서산

충남 서산 지역의 토마토반점위조바이러스의 확산 상황을 조사 하였다. 고추 재배 포장 주변의 감자, 토마토 등에서 바이러스의 전형적인 증상과 바이러스 감염을 확인하였다. 2007년 6월 12일 촬영

▼ 감자 잎에 원형괴저반점의 특징적인 증상이다.

